

## NOTE

# SUR LES NÉVROPTÈRES ODONATES

Recueillis en Mingrèlie en 1868 par M. Théophile Deyrolle,

PAR

Edm. de SÉLYS-LONGCHAMPS.

Notre collègue, M. MacLachlan, a bien voulu examiner les Névroptères non-Odonates recueillis en Mingrèlie par M. Th. Deyrolle. Afin de compléter cette partie, j'ajoute une note concernant les Odonates.

J'ai examiné 40 exemplaires formant en tout 10 espèces, ce qui certainement ne constitue pas le cinquième des espèces que l'on doit rencontrer en Mingrèlie. Toutes sont des espèces européennes, mais presque la moitié d'entre elles sont particulières au midi.

En voici la liste :

1. **Libellula depressa**, L.

2. **Libellula fulva**, Müll.

3. **Libellula Ramburii**, de Selys.

C'est une localité nouvelle pour cette espèce qui est intermédiaire entre les *Libellula cærulescens*, F. et *brunnea*, Fonsc. et dont l'habitat connu jusqu'ici était la Sardaigne, l'Algérie, l'île de Crète, l'Égypte et la Syrie.

4. **Æschna microstigma**, Schneider.

L'espèce découverte à Kellemiş en Asie-mineure par M. Loew, a été retrouvée depuis à Corfou, par M. Erber.

5. *Æschna rufescens*, Vanderlinden.

L'habitat en Asie n'était pas connu.

6. *Calopteryx virgo*, L.

Ils appartiennent à la race *festiva*, Brullé, observée en Grèce et dans l'Asie mineure, mais cette forme est en réalité peu tranchée et présente parfois de petits exemplaires, qui ne diffèrent guère de la *virgo* septentrionale. La base des ailes n'est jamais hyaline comme cela se voit, au contraire, chez la *virgo* méridionale du sud-ouest de l'Europe.

7. *Calopteryx splendens*, Harris.

Représentée par deux mâles très intéressants qui indiquent peut être une nouvelle race que je nomme *mingrelica*, un peu différente de la *splendens* méridionale (*xanthostoma*, Charp.) parce que la partie terminale opaque des ailes ne commence qu'un peu après le nodus (chez un exemplaire le bout des ailes est légèrement hyalin). Les tubercules du derrière des yeux semblent plus obtus, à peu près comme chez l'*exul* (Selys) d'Algérie à laquelle ils ressemblent encore par le 2<sup>e</sup> article des antennes jaune.

Elle serait donc en quelque sorte intermédiaire entre la *splendens* méridionale et l'*exul* ce qui porterait à croire que cette dernière et même la *Syriaca* (Géné) du Mont-Liban ne sont aussi que des races de la *splendens*. Il est remarquable que chez la race mingrélienne la réticulation postcostale par la direction droite du rameau du 2<sup>e</sup> secteur du triangle et par la complication des cellules, ressemble à la *splendens* septentrionale et non à la méridionale.

8. *Platycnemis pennipes*, Pall. var. *albidella*.9. *Agrion minium*, Harris.10. *Agrion pulchellum*, Vander Linden.

Les dix exemplaires reçus appartiennent à la variété chez laquelle la raie antéhumérale bleue (♂) ou verdâtre (♀) est entière comme chez l'*Agrion puella*, L.; et non interrompue en point d'exclamation. Cette variété est au contraire peu fréquente en Europe.